

レジメン名			レジメン番号	1クールの日数
大腸癌modFOLFIRI療法			C18-03	28日
適応病名	大腸癌		投与所要時間	180分 (5FU持続2760分)
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	イリノテカン	150mg/m2	div	d1,15
2	レボホリナート	200mg/m2	div	d1,15
3	5-FU	400mg/m2	div	d1,15
4	5-FU	2400mg/m2	civ	d1-2,15-16

癌化学療法処方

C18-11 大腸癌modFOLFIRI療法		時間
第1日目、第15日目		
①	5%ブドウ糖液50mL＋アロキシ0.75mg＋デキサート6.6mg	15分
②	5%ブドウ糖液250mL＋レボホリナート200mg/m ² ③と同時に開始	120分
③	5%ブドウ糖液250mL＋イリノテカン150mg/m ² ②と同時に開始	90分
④	5%ブドウ糖液適量＋5-FU400mg/m ² 総量50mLにして	5分
⑤	5%ブドウ糖液50mL	5分
⑥	5%ブドウ糖液適量＋5-FU2400mg/m ² （外来：携帯型ポンプで総量230mLにして）	46時間
⑥’	5%ブドウ糖液500mL＋5-FU2400mg/m ² （病棟：輸液ポンプ利用）	46時間
第3日目、第17日目		
①	ヘパフラッシュ1000単位	フラッシュ
28日を1コースとし上記を施行する		