

レジメン名			レジメン番号	1クールの日数
乳癌3週毎ドセタキセル+トラスツズマブ療法			C50-18B3	21日
適応病名	乳癌		所要時間	200分
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ドセタキセル(タキソテール)	75 mg / m2	div	d1
2	トラスツズマブ(ハーセプチン)	6 mg / kg	div	d1

癌化学療法処方

乳癌3週毎ドセタキセル+トラスツズマブ療法 (下に実際の投与方法を記載)			200分	
Day1	①	グラニセトロン3mg+デキサート1.65mg	div	15分
	②	ドセタキセル 75mg/m2+5% gl 250mL	div	90分
	③	生食50ml	div	5分
	④	トラスツズマブ 6mg / kg+生食250mL	div	90分
	⑤	生食50ml	div	5分

ドセタキセル、トラスツズマブはday1 に投与、21日を1クールとする。
吐き気止めとしてHT3-antagonistやステロイドを入れる。

トラスツズマブは初回導入時のみ、8mg / kg で投与し、以後は6mg / kg で投与。
1回目の投与で、アレルギー症状などの副作用がなければ、2回目以降は、投与時間を30分に短縮可能。

プロトコール適応時表示コメント

吐き気止めとしてHT3-antagonistやステロイドを入れる。トラスツズマブは初回導入時のみ、8mg / kg で投与し、以後は6mg / kg で投与。なお、1回目の投与で、アレルギー症状などの副作用がなければ、2回目以降は、投与時間を30分に短縮可能である。

グレイ（備考欄: