

レジメン名				
乳癌 PEMB(3w)+GEM+CBDCA療法				
レジメン番号	C50-34c1	1クールの日数	21日	
番号	抗がん薬名(商品名)	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	div	d1
2	ゲムシタビン(ジェムザール)	1000mg/m ²	div	d1,8
3	カルボプラチン(カルボプラチン)	AUC2	div	d1,8

がん化学療法処方

プロトコール名 乳癌 PEMB(3w)+GEM+CBDCA療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生食50mL(プライミング用)	点滴静注	
	② キイトルーダ200mg+生食50mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
	④ アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食50mL	点滴静注	15分
	⑤ ジェムザール1000mg/m ² +生食100mL	点滴静注	30分
	⑥ カルボプラチン AUC2+5%ブドウ糖250mL	点滴静注	60分
	⑦ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
d8	① アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg+生食50mL	点滴静注	15分
	② ジェムザール1000mg/m ² +生食100mL	点滴静注	30分
	③ カルボプラチン AUC2+5%ブドウ糖250mL	点滴静注	60分
	④ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分

プロトコール適応時表示コメント

診療科登録制(リスト参照)

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄)