

レジメン名				
乳癌 PEMB(6w)+PTX療法				
レジメン番号	C50-35c2		1クールの日数	84日
番号	抗がん薬名(商品名)	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	400mg	div	d1,43
2	パクリタキセル(パクリタキセル)	90mg/m ²	div	d1,8,15,29,36,43,57,64,71

がん化学療法処方

プロトコール名 乳癌 PEMB(6w)+PTX療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1,43	① 生食50mL(プライミング用)	点滴静注	
	② キイトルーダ400mg＋生食50mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
	④ デキサート6.6mg＋ファモチジン20mg＋生食50mL 点滴開始と同時にレスタミンコーワ錠10mg 5錠内服	点滴静注	10分
	⑤ 生食100mL	点滴静注	30分
	⑥ パクリタキセル90mg/m2＋5%ブドウ糖 250mL ※インラインフィルター使用	点滴静注	60分
	⑦ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
d8,15,29,36,57,64,71	① デキサート6.6mg＋ファモチジン20mg＋生食50mL 点滴開始と同時にレスタミンコーワ錠10mg 5錠内服	点滴静注	10分
	② 生食100mL	点滴静注	30分
	③ パクリタキセル90mg/m2＋5%ブドウ糖 250mL ※インラインフィルター使用	点滴静注	60分
	④ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
d1,8,15,29,36,43,57,64,71	(前投薬)レスタミンコーワ錠10mg 5錠	内服	

プロトコール適応時表示コメント

診療科登録制(リスト参照)
パクリタキセル投与30分前までにレスタミンコーワ錠10mgを5錠内服する。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: