

プロトコール名				
乳癌 PEMB(3w)+nab-PTX療法				
適応病名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	1クールの日数	84日	
番号	抗がん薬名(商品名)	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	div	d1,22,43,64
2	nab-パクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m ²	div	d1,8,15,29,36,43,57,64,71

がん化学療法処方

プロトコール名 乳癌 PEMB(3w)+nab-PTX療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
day1,43,64	① 生食50mL(プライミング用)	点滴静注	
	② キイトルーダ200mg+生食50mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用) ※ライン交換 要	点滴静注	5分
	④ アブラキサン100mg/m ² +生理食塩水20mL/m ² インラインフィルター使用不可 最終濃度は5mg/mL 空の生食100mLボトルに入れて払い出し	点滴静注	30分
	⑤ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
day8,15,29,36,57,71	① 生食50mL(プライミング用)	点滴静注	
	② アブラキサン100mg/m ² +生理食塩水20mL/m ² インラインフィルター使用不可 最終濃度は5mg/mL 空の生食100mLボトルに入れて払い出し	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
day22	① 生食50mL(プライミング用)	点滴静注	
	② キイトルーダ200mg+生食50mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分

プロトコール適応時表示コメント

診療科登録制(リスト参照)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)