

レジメン名				
乳癌術前 ペンブロリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン(3週毎)療法				
レジメン番号	C50-40c2		1クールの日数	21日
番号	抗がん薬名(商品名)	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	キートルーダ	200mg	iv	d1
2	パクリタキセル	80mg/m2	iv	d1, d8, d15
3	カルボプラチン	AUC 5	iv	d1

がん化学療法処方

プロトコール名 乳癌 ペンブロリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン(3週毎)療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生食50mL(プライミング)	点滴静注	—
	② キイトルーダ200mg＋生食100mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	④ グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL＋デキサート6.6mg＋ガスター20mg パクリタキセル投与30分前までに投与	点滴静注	30分
	⑤ 生食50mL	点滴静注	30分
	⑥ パクリタキセル注80mg/m2＋生食250mL ※PVCフリー点滴セット, インラインフィルターを使用	点滴静注	60分
	⑦ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	⑧ カルボプラチン注AUC 5＋生食250ml	点滴静注	60分
	⑨ 生食50ml(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	レスタミンコーワ錠 50mg アプレピタントカプセル125mg 化学療法投与1時間前	内服 内服	— —
d8	⑩ デキサート6.6mg＋ガスター20mg＋生食50mL パクリタキセル投与30分前までに投与	点滴静注	30分
	⑪ 生食50mL	点滴静注	30分
	⑫ パクリタキセル注80mg/m2＋生食250mL ※PVCフリー点滴セット, インラインフィルターを使用	点滴静注	60分
	⑬ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	レスタミンコーワ錠 50mg	内服	—
d15	⑭ デキサート6.6mg＋ガスター20mg＋生食50mL パクリタキセル投与30分前までに投与	点滴静注	30分
	⑮ 生食50mL	点滴静注	30分
	⑯ パクリタキセル注80mg/m2＋生食250mL ※PVCフリー点滴セット, インラインフィルターを使用	点滴静注	60分
	⑰ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	レスタミンコーワ錠 50mg	内服	—
Day2, 3 アプレピタントカプセル80mg(経口)、デキサメタゾン4mg×1錠(経口) Day4 デキサメタゾン4mg×2錠(経口)			

プロトコール適応時表示コメント

診療科登録制(リスト参照)

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄: