

レジメン名				
乳癌術前 ペンブロリズマブ・ドキソルビシン・シクロフォスファミド療法				
レジメン番号	C50-40c4		1クールの日数	21日
番号	抗がん薬名(商品名)	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	キートルーダ	200mg	iv	d1
2	ドキソルビシン	60mg/m2	iv	d1
3	シクロフォスファミド	600mg/m2	iv	d1

がん化学療法処方

プロトコール名 乳癌 ペンブロリズマブ・ドキソルビシン・シクロフォスファミド療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日 d1	薬品名	投与経路	投与時間
	① 生食50mL(プライミング)	点滴静注	—
	② キイトルーダ200mg＋生食100mL ※インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	点滴静注	30分
	③ 生食50mL(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	④ パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL＋デキサート9.9mg	点滴静注	30分
	⑤ ドキソルビシン注60mg/m2＋生食100ml	点滴静注	全開で投与 60分
	⑥ シクロフォスファミド600mg/m2＋生食250ml 無菌製剤処理料1-Ⅰ(閉鎖式接続器具使用)	点滴静注	
	⑦ 生食50ml(フラッシュ用)	点滴静注	全開
	アプレピタントカプセル125mg ドキソルビシン投与60分前に服用	内服	—

Day2, 3, アプレピタントカプセル80mg(経口)、デキサメタゾン4mg×2錠(経口)
Day4 デキサメタゾン4mg×2錠(経口)

プロトコール適応時表示コメント

診療科登録制(リスト参照)

照射併用時照射線量

グレイ(備考欄: