

レジメン名			レジメン番号	1クールの日数
乳癌 サシツズマブ ゴビテカン療法			C50-48	21日
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	サシツズマブ ゴビテカン (トロデルビ)	10mg/kg	div	d1,8

癌化学療法処方

乳癌 サシツズマブ ゴビテカン療法

投与日		投与経路	投与時間
day1、8	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ10単位/mL(ライン確保用)		
	① パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」+ デキサート9.9mg + ファモチジン20mg	div	30分
	② 生食50mL(フラッシュ用)	div	5分
	③ トロデルビ 10mg/kg + 生食250mL 最終濃度は1.1～3.4mg/mLとすること 調製後8時間以内に投与完了 【要遮光】 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降は1時間に短縮可	div	180分
	④ 生食50mL(フラッシュ用)	div	5分
day1、8	前投薬 ① アプレピタントカプセル125mg「NK」、オランザピン2.5mg2錠 抗がん薬投与の1時間～1時間半前に内服 カロナール錠500mg 1錠 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 抗がん薬点滴開始と同時に内服 頓服 アプレピタントカプセル80mg「NK」、デキサメタゾン4mg×2錠(経口)、	内服	
day2、3、9、10	オランザピン2.5mg2錠	内服	
day4、11	オランザピン2.5mg2錠	内服	

★ 21日間を1コースとして、上記を施行する。

乳腺外科
プロトコール適応時表示コメント