

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C18-02ob 大腸がん ベバシズマブ+mFOLFOX6療法

投与日	投与経路 投与時間	
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)	
	1 グラニセトロン注 1mg +デキサメタゾン注 9.9mg	div 30分
	2 ベバシズマブ 5mg/kg+生食 100mL	div 90分
	3 生食 50mL (ライン確保用)	div 全開
	3 生食 50mL (中心静脈ポートライン確保用)	div 全開
	4 レボホリナート 200mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div 120分
	4 オキサリプラチン(L-OHP) 85mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div 120分
	5 5-FU 400mg/m ² +5%ブドウ糖液 100mL	div 全開
	6 5-FU 2400mg/m ² +生食 50mL (外来：携帯型ポンプ利用)	civ 46時間
	7 生食 50mL (フラッシュ用)	div 全開
	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (終了時ヘパロック)	

14日間を1コースとして上記を施行する。

ベバシズマブ:初回は90分、問題がなければ2回目は60分で投与、
さらに問題がなければそれ以降は30分まで短縮可。
デキサメタゾン 8mgをday 2-3に内服。