

## がん化学療法レジメン

### レジメン番号:C18-06h1 大腸がん セツキシマブ +CPT-11(2週間毎)療法

| 投与日           |  | 投与経路 | 投与時間 |
|---------------|--|------|------|
| day1,15,29    | ◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)<br>1 グラニセトロン注 1mg+デキサメタゾン注 9.9mg<br>2 セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> +生食 250mL<br>3 生食 250mL<br>4 イリノテカン(CPT-11) 150mg/m <sup>2</sup> +生食 500mL<br>5 生食 50mL (フラッシュ用) | div  | 30分  |
|               | ◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (終了時ヘパロック)  | div  | 60分  |
|               |  | div  | 60分  |
|               |  | div  | 90分  |
|               |  | div  | 全開   |
| day8,22,36,43 | ◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)<br>1 デキサメタゾン 9.9mg+生食 50mL<br>2 セツキシマブ 250mg/m <sup>2</sup> +生食 250mL<br>3 生食 250mL  | div  | 30分  |
|               | ◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (終了時ヘパロック)  | div  | 60分  |
|               |  | div  | 60分  |

49日間を1コースとし、上記を施行する。

1サイクルの1日目のみ、セツキシマブの用量・投与時間を 400mg/m<sup>2</sup>, 120分とする。  
セツキシマブ投与30分前にジフェンヒドラミン錠 10mgを5錠内服。  
デキサメタゾン 8mgをday 2-3,day 16-17,day 30-31に内服。