

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C18-10oG 大腸がん パニツムマブ + mFOLFOX6療法

投与日		投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 グラニセトロン注 1mg +デキサメタゾン注 9.9mg	div	30分
	2 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	3 パニツムマブ 6mg/kg +生食 100mL	div	60分
	4 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	4 生食 50mL (中心静脈ポート側管ライン確保用)	div	全開
	5 レボホリナート(I-LV) 200mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div	120分
	5 オキサリプラチン(L-OHP) 85mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div	120分
	6 5-FU 400mg/m ² +5%ブドウ糖液 100mL	div	全開
	7 5-FU 2400mg/m ² +生食 50mL (外来:携帯型ポンプ利用)	civ	46時間
	8 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (終了時ヘパロック)		

14日間を1コースとして上記を施行する。

デキサメタゾン 8mgをday 2-3に内服。