

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C18-12o 大腸がん FOLFOXIRI療法

投与日		投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg	div	30分
	2 イリノテカン(CPT-11) 165mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div	60分
	3 5%ブドウ糖 100mL (中心静脈ポートライン確保用)	div	30分
	4 レボホリナート(I-LV) 200mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div	120分
	4 オキサリプラチニ(L-OHP) 85mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div	120分
	5 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	6 5-FU 3200mg/m ² +生食 50mL (外来:携帯型ポンプ利用)	civ	46時間
	7 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		

14日間を1コースとし、上記を施行する。

アプレビタントカプセル 125mgをday1, 80mgをday2-3に内服
デキサメタゾン 8mgをday2-4に内服。