

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-08B5 乳がん ベバシズマブ+PTX療法

投与日		投与経路	投与時間
day1,15	◎ ヘパリンNaロック用シリソルジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 デキサメタゾン注 6.6mg + フアモチジン注 20mg + 生食 50mL	div	30分
	2 ベバシズマブ 10mg/kg + 生食 100mL	div	90分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	4 パクリタキセル(PTX) 90mg/m ² + 生食 250mL	div	60分
	5 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
day8	◎ ヘパリンNaロック用シリソルジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 デキサメタゾン注 6.6mg + フアモチジン注 20mg + 生食 50mL	div	30分
	3 生食 50mL	div	30分
	3 パクリタキセル(PTX) 90mg/m ² + 生食 250mL	div	60分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開

28日間を1コースとして、上記を施行する。

ベバシズマブ:初回は90分、問題がなければ2回目は60分で投与、
さらに問題がなければそれ以降は30分まで短縮可。
パクリタキセル投与30分前にジフェンヒドラミン錠 10mgを5錠内服。