

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-33c1 乳がん アテゾリズマブ+nab-PTX療法

投与日		投与経路	投与時間
day1,15	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (ライン確保用)	div	全開
	2 アテゾリズマブ 840mg+生食 250mL	div	60分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	4 アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX) 100mg/m ² +生食 100mL	div	30分
	5 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
day8	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (ライン確保用)	div	全開
	2 アルブミン懸濁型パクリタキセル 100mg/m ² +生食 100mL	div	30分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開

28日間を1コースとして、上記を施行する。

アルブミン懸濁型パクリタキセル:初回は60分、初回投与の忍容性が良好であれば
2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。

アテゾリズマブ:初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可