

## がん化学療法レジメン

### レジメン番号:C50-34c1 乳がんペムプロリズマブ(3w)+GEM+CBDCA療法

投与日		投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (ライン確保用)	div	全開
	2 ペムプロリズマブ 200mg + 生食 100mL	div	30分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	4 パロノセトロン注0.75mg + デキサメタゾン注 9.9mg	div	30分
	5 ゲムシタビン(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup> + 生食 100mL	div	30分
	6 カルボプラチナ(CBDCA) AUC2 + 生食 250mL	div	60分
	7 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
day8	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 パロノセトロン注 0.75mg + デキサメタゾン注 9.9mg	div	30分
	2 ゲムシタビン(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup> + 生食 100mL	div	30分
	3 カルボプラチナ(CBDCA) AUC2 + 生食 250mL	div	60分
	4 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開

21日間を1コースとして、上記を施行する。