

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-35c2 乳がん ペムブロリズマブ(6w)+PTX療法

投与日		投与経路	投与時間
day1,43	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	2 ペムブロリズマブ 400mg+生食 100mL	div	30分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	4 デキサート6.6mg+ガスター20mg+生食 50mL	div	30分
	5 生食 50mL	div	30分
	6 パクリタキセル(PTX) 90mg/m ² +生食 250mL	div	60分
	7 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
day8,15,29,36,57,64,71	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 デキサメタゾン注 6.6mg+ファモチジン注 20mg+生食 50mL	div	30分
	2 生食 50mL	div	30分
	3 パクリタキセル(PTX) 90mg/m ² +生食 250mL	div	60分
	4 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開

84日間を1コースとして、上記を施行する。

パクリタキセル投与30分前までにジフェンヒドラミン錠 10mgを5錠内服。