

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-36c1 乳がん ペムブロリズマブ(3w)+nab-PTX療法

投与日	投与経路	投与時間
day1,43,64	◎ ヘパリンNaロック用シリソジ 10単位/mL (ライン確保用) 1 生食 50mL (ライン確保用) 2 ペムブロリズマブ 200mg + 生食 100mL 3 生食 50mL (フラッシュ) 4 アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX) 100mg/m ² + 生食 100mL 5 生食 50mL (フラッシュ用)	div 全開 div 30分 div 全開 div 30分 div 全開
day8,15,29,36,57,71	◎ ヘパリンNaロック用シリソジ 10単位/mL (ライン確保用) 1 生食 50mL (ライン確保用) 2 アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX) 100mg/m ² + 生食 100mL 3 生食 50mL (フラッシュ用)	div 全開 div 30分 div 全開
day22	◎ ヘパリンNaロック用シリソジ 10単位/mL (ライン確保用) 1 生食 50mL (ライン確保用) 2 ペムブロリズマブ 200mg + 生食 100mL 3 生食 50mL (フラッシュ)	div 全開 div 30分 div 全開

84日間を1コースとして、上記を施行する。