

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-40c1 乳がん ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA(1週毎)療法

投与日		投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (ライン確保用)	div	全開
	2 ペムブロリズマブ 200mg+生食 100mL	div	30分
	3 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	4 グラニセトロン注 1mg +デキサメタゾン注 6.6mg+ファモチジン注 20mg	div	30分
	5 生食 50mL	div	30分
	6 パクリタキセル(PTX) 80mg/m ² +生食 250mL	div	60分
	7 生食 50mL (フラッシュ用)	div	全開
	8 カルボプラチン(CBDCA) AUC 1.5+生食 250mL	div	60分
	9 生食 50mL(フラッシュ用)	div	全開
day8,15	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 グラニセトロン注 1mg +デキサメタゾン注 6.6mg+ファモチジン注 20mg	div	30分
	2 生食 50mL	div	30分
	3 パクリタキセル(PTX) 80mg/m ² +生食 250mL	div	60分
	4 生食 50mL(フラッシュ用)	div	全開
	5 カルボプラチン(CBDCA) AUC 1.5+生食 250mL	div	60分
	6 生食 50mL(フラッシュ用)	div	全開

21日間を1コースとして、上記を4コース施行する。

パクリタキセル投与30分前までにジフェンヒドラミン錠 10mgを5錠内服。

アブレピタントカプセル 125mgをday1, 8,15に内服。

アブレピタントカプセル 80mgをday2-3, day9-10,day16-17に内服。