

がん化学療法レジメン

レジメン番号:C50-45h1 乳がん トラスツズマブ+DTX+CBDCA療法

投与日		投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ 10単位/mL (ライン確保用)		
	1 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	2 トラスツズマブ 8mg/kg+生食 250mL	div	90分
	3 パロノセトロン 0.75mg+デキサート 4.95mg	div	30分
	4 ドセタキセル(DTX) 75mg/m ² +生食 250mL	div	60分
	5 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開
	6 カルボプラチン(CBDCA) AUC 6+生食 250mL	div	60分
	7 生食 50mL (フラッシュ)	div	全開

21日間を1コースとして、上記を施行する。

トラスツズマブ:初回のみ8mg/kgで投与し、以後は6mg/kgで投与。

1回目の投与でアレルギー症状などの副作用がなければ、

2回目以降は投与時間を30分に短縮可。

投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて8mg/kgで投与を行う。

初回のみロキソプロフェンをトラスツズマブ投与30分前に内服。

アプレピタントカプセル 125mgをday1, 80mgをday2-3に内服。

デキサメタゾン 4mgをday2-3に内服。